

UN CURCULIONIDE NOUVEAU D'AUSTRALIE

par Albert Bovie.

Flamingorrhynchus Helleri n. sp. — Longueur 34 mill. (rostre exclus). — D'un rouge brique plus ou moins brillant et marqué de noir. Tête rouge à l'exception de l'extrémité du rostre, des scrobes et des antennes qui sont noirs; en outre, le haut de la tête est légèrement rembruni. Prothorax un tant soit peu plus long que large, aplati sur le disque, ses bords latéraux arrondis; marqué à la base, en face du milieu de la base de chaque élytre, d'une tache noire presque triangulaire; ayant, en outre, au milieu une ligne longitudinale noire allant en s'amincissant vers la base, mais sans l'atteindre, et rejoignant le bord antérieur du prothorax; celui-ci marqué d'un collier noir bien accusé. Au-dessous, on voit une tache noire en forme de V dont la base entoure la naissance des pattes et dont une des branches se dirigeant vers le collier noir du thorax, l'atteint à la hauteur des yeux, l'autre branche remontant à angle presque droit avec la première. Écusson enfoncé, noir. Élytres finement ponctuées, à stries très nettement et profondément marquées, les trois dernières n'atteignant pas la base, rouges et portant au milieu une grosse tache noire, plus ou moins grande selon les exemplaires; en outre, leur extrémité est noire, plus ou moins également selon les individus, mais n'atteignant pas plus du quart de la longueur de l'élytre. Dessous du corps et de l'abdomen noirs, à l'exception d'une tache rouge, presque carrée, située entre les deux dernières paires de pattes, cette tache envoyant un rameau rejoindre le deuxième arceau de l'abdomen qui est rouge également. Pygidium noir, portant à l'extrémité une bande de poils rouges très courts et offrant, de chaque côté, près de l'extrémité, une légère fossette. Pattes rouges, à l'exception de l'extrémité noire des cuisses. Tout l'insecte est finement mais sobrement marqué d'une ponctuation un peu plus abondante en dessous qu'en dessus.

Patrie : Australie. J'en ai reçu quatre exemplaires de M. Clavaureau et un du docteur Plason; trois sont dans ma collection, un dans la collection Desbrochers, le cinquième au Musée de Dresde; M. Heller, à qui j'avais communiqué cette espèce, a bien voulu me la signaler comme non décrite et faisant partie de son nouveau genre *Flamingorrhynchus* (Abhandl. Mus. Dresden, 1902, 2, p. 18), genre si remarquable par la forme singulière de son rostre. L'autre espèce est le *Weiskei* (Heller, l. c., p. 19), provenant de la Nouvelle-Guinée.
